

apoquel[®]
(oclacitinib tablet)



WHAT
MAKES DOGS
ITCH?

מידע בטיחותי חשוב:

אין להשתמש אם ידועה רגישות למרכיב הפעיל או לאחד ממרכיבי התכשיר, בכלבים בני פחות מ- 12 חודשים או ששוקלים פחות מ- 3 ק"ג, בכלבים המציגים דיכוי חיסוני או אם יש עדות לגידולים ממאירים מתקדמים. השימוש בתרופה עלול להגביר סיכון לפתח זיהומים ולהחמיר מצב של גידולים ממאירים קיימים. תופעות הלוואי הנפוצות הן דלקות עור וגושים עוריים לא ספציפיים (נצפו ביותר מכלב 1 מתוך 10 שטופלו בתרופה), שלשולים והקאות (1-10 כלבים מתוך 100 שטופלו בתרופה). לא מומלץ להשתמש במהלך הריון, הנקה או בכלבים המיועדים להרבעה.

אזהרות לבני אדם:

יש לשטוף ידיים בתום השימוש. במידה והתכשיר נבלע בטעות, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית באופן מיידי ולהראות את עלון או אריזת התכשיר. לרשימת תופעות הלוואי המלאה יש לעיין בעלון לצרכן. לשאלות נוספות יש לפנות לוועידת המטפל.

המידע נכון לינואר 2020

המידע נכתב בחסות בעל הרישום ובמימון: זואטיס ישראל הולדינג בי.וי.

טלפון: 09-7886640 מייל: animal.health2@zoetis.com

בקרו אותנו: Zoetis.co.il

להקלה מהירה בתחילת הדרך

zoetis

FOR ANIMALS FOR HEALTH FOR YOU

zoetis זואטיס חברה מובילה בחדשנות וטרינרית למעלה מ- 75 שנה

שאלות נפוצות

מדוע נרשם לכלב שלי אפוקוול (אוקלסיטיניב)?

טבליות מצופות של אפוקוול (אוקלסיטיניב) 3.6, 5.4, 16 מ"ג וטרינרי מכילות את החומר הפעיל oclacitinib maleate, ומשמשות לשליטה בגרד הקשור בדלקת עור אלרגית ושליטה בדלקת עור אטופית בכלבים מעל גיל 12 חודשים.

האם אפוקוול (אוקלסיטיניב) היא סטרואיד?

התרופה איננה סטרואיד, היא תרופה חדשנית השולטת במקור הגרד האלרגי, עם פחות תופעות לוואי האופייניות לטיפולים בחומרים אחרים.

האם ניתן להשתמש באפוקוול (אוקלסיטיניב) לטווח קצר כדי לטפל בגרד?

כן, אפשר להשתמש בתרופה לטווח קצר. השפעת התרופה מתחילה תוך 4 שעות, ומגיעה לשליטה מלאה בגרד תוך 24 שעות.

במשך כמה זמן יכול הכלב שלי להיות מטופל באפוקוול (אוקלסיטיניב)?

לא נקבעה מגבלת זמן לשימוש באפוקוול (אוקלסיטיניב), ניתן להמשיך עם הטיפול בתרופה כל עוד הווטרינר סבור שהטיפול מתאים.

האם יש לתת את התרופה עם אוכל?

ניתן לתת אפוקוול (אוקלסיטיניב) לכלב, עם או בלי אוכל.

האם ניתן לשלב אפוקוול (אוקלסיטיניב) עם תרופות אחרות?

אפוקוול נמצא בטוח בשילוב עם כל החיסונים ומרבית התרופות הווטרינריות כגון: תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAID), חיסונים, אנטיביוטיקה, או קוטלי טפילים.

האם ניתן לחצות את הטבליה?

הטבליה ניתנת לחציה לאורך קו החציה בלבד. אין לשבור את הטבליה לחלקים קטנים יותר. שבירת הטבליה לחלקים קטנים יותר תפגע ביעילות הטיפול עקב מינון לא מדויק. ניתן לשמור טבליה חצויה עד 3 ימים.

3 הגורמים הנפוצים להתלקחות הגרד בכלבים אלרגיים:

פרעושים 

אלרגנים סביבתיים (לדוגמא: אבקנים, עובשים, קרדית האבק וכו') 

מזון 

אלרגיה בכלבים עלולה לגרום לאחד או יותר מהסימנים הבאים:

גרוד אינטנסיבי (לעיתים עד כדי פציעה עצמית)

אדמומיות בעור

דלקות אוזניים

נשירת פרווה

ליקוק ולעיסת כפות רגליים

התחככות וגרירת הישבן

לקויות עוריות שונות

ריח גוף לא נעים



zoetis