

טיפול בגרד
מהיר ובטוח
יותר!



אפוקוול. תרופה פורצת דרך לטיפול בגרד

זואטיס חברה מובילה בחדשנות וטרינרית למעלה מ-75 שנה

zoetis

אפוקוול תרופה פורצת דרך לטיפול בגרד

הבחירה הראשונה לטיפול בגרד הקשור למחלות אלרגיה בכלבים

תוצאות טיפוליות של אפוקוול וסטרואידים אחרים

תוצאה טיפולית רצויה	אפוקוול	סטרואידים
מפחית משמעותית את הגרד תוך 1-4 שעות	✓	✓
פרופיל תופעות לוואי דומה לפלצבו ⁹	✓	✗
טיפול ממוקד ¹⁰	✓	✗
יכולת לבצע בדיקות אלרגיה ללא הפסקת הטיפול הקיים.	✓	✗
ניתן לשימוש במקביל עם תרופות רבות אחרות, כולל NSAID ³	✓	✗
מאפשר לכלב ולבעליו איכות חיים טובה יותר (מטופלים עם דלקת מפרקים ניוונית יכולים להמשיך בטיפול בתרופות NSAID תוך כדי הטיפול באפוקוול; ניתן לשימוש בכלבים המקבלים טיפול לסוכרת)	✓	✗
המנעות מתלות בסטרואידים.	✓	✗
גמישות המאפשרת הפסקה מיידית ללא זמן גמילה.	✓	✗
מינון חד יומי, פשוט ויעיל	✓	✗


ניתן להשתמש באפוקוול במצבים הבאים:

פרעושים שליטה או טיפול בדלקת עור הנגרמת מאלרגיה לפרעושים.
גורמים אלרגיים היוצרים תגובה אלרגית במגע לפני/אחרי חשיפה (לדוגמא: דשא, כימיקלים).
אלרגיות למזון שמירה על איכות חיי הכלב האלרגי למזון, במהלך מבחני הזנה.
אטופי טיפול בסימנים קליניים הקשורים לדרמטיטיס ממקור אלרגי, אפילו תוך כדי בדיקות IDT או אימונותרפיה.

מקורות

1. Veterinary pharmacology and therapeutics, 9th Ed. Wiley and Blackwell, 2009. Riviere, J., Papich, M. & Adams, H. 2. Kirks Current Veterinary Therapy Chapter 89, p 400-405. Glucocorticoids in Veterinary Dermatology, Candace Sousa, 3. Apoquel Technical Monograph. 4. Small Animal Clinical Pharmacology 2nd Ed. 2008. Madisson J, Page S, Church D. Glucocorticosteroids and Antihistamines. Pp 261-269. Day M. Saunders Elsevier. 5. Plumbs Veterinary Drugs. iPhone App. 2016. 6. Notari L, Mills, D. Possible Behavioural effects of exogenous corticosteroids on dog behaviour: a preliminary investigation. Journal of Veterinary Behaviour 2011; 6: 321-327. 7. Olivry T, Saridomichelakis M. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal and IgE serological tests in dogs. Vet Dermatol. 2013; 24: 225-e49. 8. Fleck, T. et al. Comparison of the onset and anti-pruritic activity of the JAK inhibitor oclacitinib to prednisolone and dexamethasone in an IL-31 canine model of pruritus. NAVDF. 2013. 9. Cosgrove SB, Wren JA, Cleaver DM, Martin DD, Walsh KF, Harfst JA, Follis SL, King VL, Boucher JF, Stegemann MR. Efficacy and safety of oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs with canine allergic dermatitis. Vet Dermatol. 2013; 24: 479-e114. 10. Gonzales et al. Oclacitinib (APOQUEL) is a novel Janus kinase inhibitor with activity against cytokines involved in allergy J. Vet Pharmacol. Therap. 37, 317-324.

תופעות לוואי אפשריות המזוהות עם שימוש בסטרואידים 1, 2, 4, 5



ZI/10/17/01

תופעות לוואי של סטרואידים המשפיעות על בעלי כלבים

- תופעה:** רעב מוגבר (פוליפגיה)
 השפעה: תחנונים לאוכל; גניבת מזון משולחן המטבח/צלחות אוכל; אכילת מזון לחתולים/צואת חתולים; נבירה באשפה, סכנות מבליעת עצמים זרים, כמו שיפודי עץ.
- תופעה:** השתנה מוגברת (פוליאוריה)
 השפעה: תחנונים לצאת בתכיפות רבה יותר; קימה בלילה כדי להוציא את הכלב; "תאונות" בבית; התמודדות עם ריח שתן.
- תופעה:** צימאון מוגבר (פולידיפסיה)
 השפעה: צורך למלא את קערת המים בתדירות גבוהה; שתייה מהאסלה; דאגה שלכלב תהיה מספיק גישה למים.
- תופעה:** שינוי התנהגותי
 השפעה: תוקפנות; שמירה מגוננת על מזון; רכושנות לגבי צעצועים; סיכון עם ילדים קטנים; הכלב "איננו עצמו"; אדישות וחוסר פעילות; התנשפויות שמפריעות לשנת הבעלים בלילה.